**FRACTURA PERIPROTÉSICA SOBRE ARTROPLASTIA DE CADERA:
NUESTRA EXPERIENCIA.**

HERNÁNDEZ FERRANDO, LORENZO; MARTINEZ VELLOSILO, DAVID;
BERTÓ MARTÍ, X; BRU POMER, A.
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO VALENCIA

Introducción y objetivos:

Las fracturas periprotésicas femorales son una complicación cada vez más frecuente en nuestra práctica quirúrgica diaria dado el aumento de implantes protésicos en las últimas décadas. El objetivo del estudio es el análisis del resultado en nuestro servicio del tratamiento quirúrgico de este tipo de fracturas.

Material y métodos:

Presentamos un estudio retrospectivo de 36 fracturas periprotésicas de caderas intervenidas entre 2000 y 2008. Las fracturas fueron clasificadas según el sistema de Vancouver y para la evaluación de los resultados funcionales se utilizó la escala de Harris.

Resultados:

Se revisan un total de 35 pacientes con 36 fracturas periprotésicas, mujeres (60%) y varones (40%). La edad media fue de 76,3 años. El 65% tipo B de Vancouver. Se realizó tratamiento conservador en 4 pacientes, el resto se intervinieron quirúrgicamente presentando unos resultados clínicos y radiológicos satisfactorios.

Discusión y conclusiones:

Las fracturas periprotésicas en las artroplastias de cadera constituyen una complicación grave para el paciente y un desafío para el cirujano ortopédico. Se trata de una cirugía técnicamente compleja que precisa de material de osteosíntesis, utilización de aloinjerto, y en algunos casos específicos recambio de vástagos protésicos.