OBJETIVO.-

“CONDROMATOSIS SINOVIAL DE CADERA TRATADA POR ARTROSCOPIA”

R. Lax Pérez; S. Arlandis Villarroya ; D. Coves Mojica;
A. Corraliza Zamorano; F. Marcos Morales; JA Lozano Requena
Hospital Vega Baja (Alicante).

- Descripción de una localización poco habitual de una condromatosis sinovial, en cadera, como causa de dolor crónico y limitación, sin traumatismo asociado.
- Se trató mediante la extracción de los componentes de la condromatosis mediante una artroscopia de cadera, quedando el paciente asintomático

Condromatosis m.o con H.E

CASO CLÍNICO.-

“CONDROMATOSIS SINOVIAL DE CADERA TRATADA POR ARTROSCOPIA”

R. Lax Pérez; S. Arlandis Villarroya ; D. Coves Mojica;
A. Corraliza Zamorano; F. Marcos Morales; JA Lozano Requena
Hospital Vega Baja (Alicante).

- Paciente de 42 años que refiere dolor en cadera derecha de dos años de evolución, sin traumatismo previo.

- Presenta:

- dolor de tipo mecánico e intermitente en cadera,
- con balance articular disminuido y doloroso para la flexión máxima, abd y Rotac.

- En el estudio radiológico se observan cuerpos libres en articulación coxofemoral, (Fig 1) , así como en el TAC (Fig. 2)

R. Lax Pérez; S. Arlandis Villarroya ; D. Coves Mojica;
A. Corraliza Zamorano; F. Marcos Morales; JA Lozano Requena
Hospital Vega Baja (Alicante).

- Se completó el estudio con RMN, que sugirió el diagnóstico de condromatosis sinovial. (Fig 3)
- Se realizó una artroscopia de cadera, extrayendo 7 cuerpos intraarticulares y se realizó una sinovectomía parcial. (Fig.4. A-B)
- El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico de condromatosis sinovial.
- Tras la cirugía el paciente inicia movilidad activa, y carga progresiva.
- Al año de evolución el paciente no refiere dolor, con un balance articular completo.

CONCLUSIONES.-

“CONDROMATOSIS SINOVIAL DE CADERA TRATADA POR ARTROSCOPIA”

R. Lax Pérez; S. Arlandis Villarroya ; D. Coves Mojica;
A. Corraliza Zamorano; F. Marcos Morales; JA Lozano Requena
Hospital Vega Baja (Alicante).

- La condromatosis sinovial en la articulación de la cadera es una localización rara.
- La cirugía artroscópica se muestra como una herramienta eficaz y poco lesiva para tratar este tipo de patología.
- Mediante una cirugía mínimamente invasiva, como la artroscopia de cadera, podemos conseguir que el paciente quede asintomático.

R. Lax Pérez; S. Arlandis Villarroya ; D. Coves Mojica;
A. Corraliza Zamorano; F. Marcos Morales; JA Lozano Requena
Hospital Vega Baja (Alicante).

1. Murphey MD, Vidal JA, Fanburg-Smith JC, Gajewski DA. Imaging of synovial chondromatosis with radiologic-pathologic correlation. *Radiographics*. 2007; 27:1465-88.
2. Lim SJ, Chung HW, Choi YL, Moon YW, Seo JG, Park YS. Operative treatment of primary synovial osteochondromatosis of the hip. *J Bone Joint Surg* 2006; 88: 2456-64.
3. Krebs VE. The role of hip arthroscopy in the treatment of synovial disorders and loose bodies. *Clin Orthop Relat Res*. 2003;406:48-59.
4. Boyer T, Dorfmann H. Arthroscopy in primary synovial chondromatosis of the hip: description and outcome of treatment. *J Bone Joint Surg* 2008; 90B: 314-8.