

# PACIENTE DE 7 AÑOS CON DOLOR INGUINAL INTERMITENTE

*Sáez Picó, Juan José; Domenech Fernandez, Pedro; Pérez Giner, Rosana; Navarro Ortiz, Ramón; Paulos Dos Santos, Flavio; Martínez López, Francisco José*

## INTRODUCCIÓN

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes es una necrosis avascular de la cabeza femoral autolimitada y de etiología incierta para la cual existen múltiples opciones terapéuticas en función de la edad y grado de afectación del paciente.



*Sáez Picó, Juan José; Domenech Fernandez, Pedro; Pérez Giner, Rosana; Navarro Ortiz, Ramón; Paulos Dos Santos, Flavio; Martínez López, Francisco José*

## MATERIAL Y MÉTODOS

- Varón de 7 años
- **MC:** Derivado por pediatra por dolor en región inguinal izquierda
- **ANTECEDENTES PERSONALES:**
  - Parto pretérmino (37ss). Sin complicaciones.
  - Vacunación al día
  - Qx: amigdalectomía (5 años)
- **ENFERMEDAD ACTUAL:**
  - Dolor región inguinocrural izquierda de 6m de evolución asociado a cojera.
  - No antecedente traumático. No fiebre. No infecciones recientes.
- **BIOQ Y HGMA** normal

## EXAMEN FÍSICO

- Marcha en Trendelemburg
- Dolor en cara anterior de cadera/ingle , muslo, rodilla izda.
- Cadera en Flex-Add-Rot. Ext.
- Atrofia leve cuádriceps.





**PACIENTE DE 7 AÑOS CON DOLOR INGUINAL  
INTERMITENTE**

**HOSPITAL GENERAL  
UNIVERSITARIO DE ALICANTE**

*Sáez Picó, Juan José; Domenech Fernandez, Pedro; Pérez Giner, Rosana; Navarro Ortiz, Ramón; Paulos Dos Santos, Flavio; Martínez López, Francisco José*



- **Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes**
- **F colapso**
- **Calcificación lateral**
- **Flexión – adducción**
- **Herring C**
- **Catteral III**








**PACIENTE DE 7 AÑOS CON DOLOR INGUINAL  
INTERMITENTE**

**HOSPITAL GENERAL  
UNIVERSITARIO DE ALICANTE**

*Sáez Picó, Juan José; Domenech Fernandez, Pedro; Pérez Giner, Rosana; Navarro  
Ortiz, Ramón; Paulos Dos Santos, Flavio; Martínez López, Francisco José*

**RESULTADOS**

**TRIPLE  
OSTEOTOMÍA  
PÉLVICA**



*Sáez Picó, Juan José; Domenech Fernandez, Pedro; Pérez Giner, Rosana; Navarro Ortiz, Ramón; Paulos Dos Santos, Flavio; Martínez López, Francisco José*

## DISCUSIÓN

INICIAL



1 AÑO DESPUÉS



- Tratamiento controvertido, fundamentalmente conservador.
  - Tratamiento quirúrgico precoz en los casos que lo precisen.
  - Buenos resultados con Triple osteotomía pélvica.
- **Enfermedad de Perthes:** causa de dolor y cojera ***persistente*** en el niño.
  - **Diagnóstico:** HC, exploración y Rx simple.
  - Existen ***factores pronósticos*** individuales del paciente y radiográficos que orientan evolución.