



COMPLICACIÓN MAYOR TRAS CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA

JAVIER SANZ REIG

JESÚS MÁS MARTÍNEZ

DAVID BUSTAMANTE SUÁREZ DE PUGA

MANUEL MORALES SANTÍAS

Unidad de Cadera. Traumatología Vistahermosa

Clínica Vistahermosa, Alicante, España



**TRAUMATOLOGÍA
VISTAHERMOSA**




COMPLICACIÓN MAYOR TRAS CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA

J Sanz Reig, J Más Martínez, D Bustamante Suarez De Puga, M Morales Santías
Unidad de Cadera. Traumatología Vistahermosa, Clínica Vistahermosa, Alicante, España

❖ Caso clínico

- ❑ Mujer. 58 años de edad
- ❑ Diagnóstico de Choque Femoroacetabular (CFA) de la cadera izquierda




COMPLICACIÓN MAYOR TRAS CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA

J Sanz Reig, J Más Martínez, D Bustamante Suarez De Puga, M Morales Santías
Unidad de Cadera. Traumatología Vistahermosa, Clínica Vistahermosa, Alicante, España

❖ Cirugía artroscópica cadera

- ❑ *Hallazgos*: rotura labrum, lesión condral acetabular espesor completo, patrón mixto CFA.
- ❑ *Tratamiento*: sutura labrum, microfracturas lesión cartilaginosa, osteoplastia acetabular y femoral



C: cápsula; CF: cabeza femoral; L: labrum
RL: rotura labrum; LCEC: lesión cartílago espesor completo

COMPLICACIÓN MAYOR TRAS CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA

J Sanz Reig, J Más Martínez, D Bustamante Suárez De Puga, M Morales Santías
Unidad de Cadera. Traumatología Vistahermosa, Clínica Vistahermosa, Alicante, España

❖Evolución

- ☐ 4º mes postoperatorio
- ☐ Dolor progresivo y cojera incapacitante
- ☐ No traumatismo previo
- ☐ VSG y PCR normal
- ☐ Radiología con disminución concéntrica del espacio articular




COMPLICACIÓN MAYOR TRAS CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA

J Sanz Reig, J Más Martínez, D Bustamante Suárez De Puga, M Morales Santías
Unidad de Cadera. Traumatología Vistahermosa, Clínica Vistahermosa, Alicante, España

❖ Revisión quirúrgica

- ❑ Adelgazamiento y separación del cartílago de la cabeza femoral compatible con CONDROLISIS; procediendo a implantar prótesis de superficie de cadera.
- ❑ Seguimiento 12 meses con una puntuación de 97 puntos en la escala de Harris.



FACTORES PREDISPONENTES

- ❖ Efecto térmico
 - ❖ Químicos
 - ❖ Iatrogenia
- ❖ Traumática
- ❖ Infección



❖ Conclusión

En nuestro caso el calor generado por el vaporizador o una lesión iatrogénica pudieron actuar como factores para el desarrollo de la condrolisis. A pesar de la baja incidencia de complicaciones mayores, es necesario informar al paciente previo a la indicación quirúrgica.