

XANTOMA DE LA VAINA TENDINOSA DEL TENDÓN DE AQUILES BILATERAL. CASO CLÍNICO

María Dolores Fernández Ruiz. Lorena Moril Peñalver. Sandra Sevilla Monllor. María Tíscar García Ortiz. Julia González Casanueva. Fernando López Prats.

Hospital General de Elche.

- * Los xantomas son depósitos de colesterol en el tejido conectivo de piel, tendones o fascia. Son el resultado de la hiperlipoproteinemia, y se manifiestan clínicamente como nódulos duros y profundos cubiertos por piel normal. Se pueden encontrar en cualquier localización, siendo más frecuentes en tendones extensores.

* Presentamos el caso de una mujer de 62 años que acude a consultas de Cirugía Ortopédica y Traumatología por la aparición espontánea de **tumoraciones polilobuladas** en la cara posterior de ambos tendones de Aquiles de varios años de evolución. Presentan **consistencia sólida** y resultan **dolorosos** a la palpación impidiéndole el uso de calzado.




Xantoma tobillo izquierdo

P-37

XANTOMA DE LA VAINA TENDINOSA DEL TENDÓN DE AQUILES BILATERAL. CASO CLÍNICO.

María Dolores Fernández Ruiz. Lorena Moril Peñalver. Sandra Sevilla Monllor. María Tíscar García Ortiz. Julia González Casanueva. Fernando López Prats. Hospital General de Elche.

- * Se solicita una RM de ambos pies y tobillos en la que se describen tumoraciones polilobuladas de entre uno y cinco centímetros de diámetro en contacto con tendón de Aquiles y tendones peroneos.



RMN PIE Y
TOBILLO
IZQUIERDO




RMN PIE Y
TOBILLO
DERECHO

XANTOMA DE LA VAINA TENDINOSA DEL TENDÓN DE AQUILES BILATERAL. CASO CLÍNICO.

María Dolores Fernández Ruiz. Lorena Moril Peñalver. Sandra Sevilla Monllor. María Tíscar García Ortiz. Julia González Casanueva. Fernando López Prats. Hospital General de Elche.



- * En 2015 se interviene el tendón de Aquiles izquierdo, realizando resección parcial de la tumoración debido a infiltración completa de todo el tendón. Anatomopatológicamente se informa de xantomas tendinosos.



XANTOMA DE LA VAINA TENDINOSA DEL TENDÓN DE AQUILES BILATERAL. CASO CLÍNICO.

María Dolores Fernández Ruiz. Lorena Moril Peñalver. Sandra Sevilla Monllor. María Tíscar García Ortiz. Julia González Casanueva. Fernando López Prats. Hospital General de Elche.

- * Al año de la intervención se revisa a la paciente encontrándose asintomática. Se interviene entonces la tumoración del tendón de Aquiles derecho realizando exéresis de la misma en 2016. Anatomopatológicamente se confirma la misma lesión.
- * En 2019 se aprecia recidiva local en RMN, sin embargo la paciente se encuentra completamente asintomática.



- * Los xantomas en el tobillo son raros, localizándose el 50% de los mismos en el tendón de Aquiles. Debido a la extensa afectación tendinosa en nuestra paciente se realizó resección parcial del xantoma.
- * A pesar de no haber realizado exéresis completa hemos obtenido un buen resultado funcional.

XANTOMA DE LA VAINA TENDINOSA DEL TENDÓN DE AQUILES BILATERAL. CASO CLÍNICO.

María Dolores Fernández Ruiz. Lorena Moril Peñalver. Sandra Sevilla Monllor. María Tíscar García Ortiz. Julia González Casanueva. Fernando López Prats. Hospital General de Elche.